

Rojan Pharma

Rotaf 25mg

ROTAF

قرص روکش دار ۲۵ میلی گرم حاوی ۲۵ میلی گرم تنوفوویر آلفناماید

روتاف یک داروی ضدویروسی است که برای درمان بیماری مزمن (طولانی مدت) ویروس هپاتیت B (HBV) در بزرگسالان مبتلا به بیماری مزمن کبدی و نوجوانان ۱۲ سال به بالا که حداقل ۳۵ کیلوگرم وزن دارند، استفاده می شود.

هپاتیت B عفونتی است که توسط ویروس هپاتیت B روی کبد اثر می گذارد. در بیماران مبتلا به هپاتیت B، روتاف با متوقف کردن تکثیر ویروس عفونت را کنترل می کند.

بسته بندی و شکل دارویی :

حاوی ۳۰ عدد قرص روکش دار زرد رنگ، در قوطی سفید پلی اتیلنی به همراه سیلیکاژل و برگه راهنمای بیمار می باشد.

موارد مصرف : روتاف برای درمان عفونت ویروسی مزمن هپاتیت B در بزرگسالان مصرف می شود.

میزان مصرف : دوز توصیه شده یک قرص، یک بار در روز همراه با غذا است. درمان باید تا مدت زمانی که دکتر مشخص می کند، ادامه یابد. معمولاً این مدت ۶ تا ۱۲ ماه است و ممکن است تا سال ها ادامه یابد.

عوارض جانبی : سردرد، درد شکمی، سرفه کردن، حالت تهوع، خستگی، درد مفصل (آرترالژیا)، تحریک شدن پوست و خارش.

شرایط نگهداری :

روتاف را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد در ظرف اصلی خود نگهداری نمایید تا در برابر نور و رطوبت محافظت شود.

پس از هر بار مصرف، درپوش بطری را محکم ببندید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



Rojan Pharma

Rotaf 25mg

هشدارها و احتیاط های لازم :

- مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند، از خود درمانی بپرهیزید.
 - پزشک خود را از همه داروهایی که مصرف می کنید مطلع سازید.
 - بدون دستور پزشک از قطع مصرف دارو خودداری نمایید.
 - تا زمان مصرف، دارو را از بسته بندی اصلی آن خارج نکنید.
 - دارو را همراه با غذا میل نمایید.
- در صورت استفاده از دوز پیشنهادی عوارض خاصی مشاهده نشده است (مگر در موارد نادر). هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است دارای یک سری عوارض جانبی نیز باشد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز نیاز به توجهات پزشک دارد. شامل :
- ایجاد مشکلات جدید یا تشدید بیماری های کلیوی از جمله نارسایی کلیه. در هنگام شروع یا در طول درمان با روتاف دستور انجام آزمایش های خون و ادرار توسط پزشک معالج جهت سلامت کلیه الزامی می باشد. اگر مشکلات جدید کلیوی یا تشدید علائم مشاهده شد، ممکن است مصرف روتاف به توصیه پزشک قطع گردد.
 - افزایش لاکتیک اسید بسیار زیاد در خون (اسیدوز لاکتیک). مقدار بیش از حد لاکتیک اسید بسیار خطرناک است که در صورت کمبود امکانات پزشکی می تواند عوارض جبران ناپذیری در پی داشته باشد. علائم آن عبارتند از : ضعف یا خستگی بیش از حد معمول، درد عضلانی غیرمعمول، تنفس آرام یا تنفس سریع، درد معده با تهوع و استفراغ، سرد شدن دست ها و پاها، احساس سرگیجه و منگی، ضربان قلب سریع یا غیرطبیعی.
 - در موارد نادر مشکلات جدی کبدی رخ می دهد. علائم آن شامل : زردی پوست یا زرد شدن قسمتی از سفیدی چشم، ادرار تیره، مدفوع رنگ روشن، بی اشتهایی به مدت چند روز یا بیشتر، حالت تهوع و درد ناحیه معده.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

اطلاعات کافی در مورد مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی وجود ندارد، لذا مصرف روتاف در این دوران بدون تشخیص پزشک توصیه نمی شود.

